

表 1666 喫煙の有無 透析前脈拍(拍/分)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

透析前脈拍	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
40未満 (%)	14 (100.0)		14 (100.0)		3	17
40～ (%)	222 (91.7)	20 (8.3)	242 (100.0)	23	30	295
50～ (%)	1,893 (90.4)	200 (9.6)	2,093 (100.0)	149	390	2,632
60～ (%)	5,979 (88.7)	758 (11.3)	6,737 (100.0)	484	1,269	8,490
70～ (%)	7,296 (87.3)	1,064 (12.7)	8,360 (100.0)	574	1,611	10,545
80～ (%)	4,774 (85.5)	809 (14.5)	5,583 (100.0)	372	1,108	7,063
90～ (%)	2,164 (82.5)	459 (17.5)	2,623 (100.0)	166	504	3,293
100～ (%)	673 (81.9)	149 (18.1)	822 (100.0)	62	158	1,042
110～ (%)	177 (82.3)	38 (17.7)	215 (100.0)	13	33	261
120～ (%)	75 (81.5)	17 (18.5)	92 (100.0)	3	11	106
合計 (%)	23,267 (86.9)	3,514 (13.1)	26,781 (100.0)	1,846	5,117	33,744
記載なし (%)	3,734 (87.3)	542 (12.7)	4,276 (100.0)	371	1,555	6,202
総計 (%)	27,001 (86.9)	4,056 (13.1)	31,057 (100.0)	2,217	6,672	39,946
平均	75.07	77.84	75.43	74.99	75.55	75.43
標準偏差	12.92	13.24	13.00	12.82	12.63	12.93

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査