

表 1673 喫煙の有無 身長(cm)別（腹膜透析患者）

身長	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
130未満	57		57	1	4	62
(%)	(100.0)		(100.0)			
130～	8		8		3	11
(%)	(100.0)		(100.0)			
135～	53		53	5	4	62
(%)	(100.0)		(100.0)			
140～	166	7	173	18	36	227
(%)	(96.0)	(4.0)	(100.0)			
145～	343	8	351	33	86	470
(%)	(97.7)	(2.3)	(100.0)			
150～	616	35	651	86	130	867
(%)	(94.6)	(5.4)	(100.0)			
155～	739	52	791	108	150	1,049
(%)	(93.4)	(6.6)	(100.0)			
160～	900	94	994	121	215	1,330
(%)	(90.5)	(9.5)	(100.0)			
165～	749	118	867	138	207	1,212
(%)	(86.4)	(13.6)	(100.0)			
170～	551	85	636	104	164	904
(%)	(86.6)	(13.4)	(100.0)			
175～	212	54	266	39	61	366
(%)	(79.7)	(20.3)	(100.0)			
180～	52	14	66	7	14	87
(%)	(78.8)	(21.2)	(100.0)			
185～	10	1	11	1	1	13
(%)	(90.9)	(9.1)	(100.0)			
190～	3		3	1		4
(%)	(100.0)		(100.0)			
合計	4,459	468	4,927	662	1,075	6,664
(%)	(90.5)	(9.5)	(100.0)			
記載なし	285	16	301	72	1,904	2,277
(%)	(94.7)	(5.3)	(100.0)			
総計	4,744	484	5,228	734	2,979	8,941
(%)	(90.7)	(9.3)	(100.0)			
平均	159.67	165.44	160.22	162.01	161.21	160.56
標準偏差	12.17	8.28	11.98	9.34	10.96	11.59

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査