

表 1675 喫煙の有無 Body Mass Index別（腹膜透析患者）

Body Mass Index	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
14未満	24	1	25	2		27
(%)	(96.0)	(4.0)	(100.0)			
14～	63	2	65	3	3	71
(%)	(96.9)	(3.1)	(100.0)			
16～	187	18	205	14	9	228
(%)	(91.2)	(8.8)	(100.0)			
18～	484	35	519	65	43	627
(%)	(93.3)	(6.7)	(100.0)			
20～	858	91	949	105	86	1,140
(%)	(90.4)	(9.6)	(100.0)			
22～	907	98	1,005	130	126	1,261
(%)	(90.2)	(9.8)	(100.0)			
24～	666	67	733	107	68	908
(%)	(90.9)	(9.1)	(100.0)			
26～	396	50	446	68	47	561
(%)	(88.8)	(11.2)	(100.0)			
28～	209	39	248	30	24	302
(%)	(84.3)	(15.7)	(100.0)			
30～	146	26	172	28	20	220
(%)	(84.9)	(15.1)	(100.0)			
合計	3,940	427	4,367	552	426	5,345
(%)	(90.2)	(9.8)	(100.0)			
記載なし	804	57	861	182	2,553	3,596
(%)	(93.4)	(6.6)	(100.0)			
総計	4,744	484	5,228	734	2,979	8,941
(%)	(90.7)	(9.3)	(100.0)			
平均	22.98	23.83	23.06	23.57	23.45	23.15
標準偏差	3.60	3.73	3.63	3.54	3.32	3.60

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査