

表 1676 喫煙の有無 BUN(mg/dL)別（腹膜透析患者）

BUN	現在吸っていない (%)	現在吸っている (%)	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	19 (100.0)		19 (100.0)	5	5	29
20～ (%)	154 (93.9)	10 (6.1)	164 (100.0)	10	9	183
30～ (%)	488 (91.0)	48 (9.0)	536 (100.0)	71	65	672
40～ (%)	988 (90.1)	108 (9.9)	1,096 (100.0)	154	142	1,392
50～ (%)	1,135 (90.9)	113 (9.1)	1,248 (100.0)	172	193	1,613
60～ (%)	793 (88.9)	99 (11.1)	892 (100.0)	123	135	1,150
70～ (%)	384 (91.4)	36 (8.6)	420 (100.0)	72	57	549
80～ (%)	162 (89.5)	19 (10.5)	181 (100.0)	35	29	245
90～ (%)	60 (88.2)	8 (11.8)	68 (100.0)	9	12	89
100～ (%)	25 (89.3)	3 (10.7)	28 (100.0)	4	8	40
110～ (%)	6 (100.0)		6 (100.0)	1		7
120～ (%)	3 (75.0)	1 (25.0)	4 (100.0)	1	2	7
合計 (%)	4,217 (90.5)	445 (9.5)	4,662 (100.0)	657	657	5,976
記載なし (%)	527 (93.1)	39 (6.9)	566 (100.0)	77	2,322	2,965
総計 (%)	4,744 (90.7)	484 (9.3)	5,228 (100.0)	734	2,979	8,941
平均	54.46	55.40	54.55	55.94	56.39	54.90
標準偏差	15.73	15.02	15.66	16.98	15.67	15.82

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査