

表 1677 喫煙の有無 クレアチニン濃度(mg/dL)別 (腹膜透析患者)

クレアチニン 濃度	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
2未満 (%)	13 (92.9)	1 (7.1)	14 (100.0)		3	17
2～ (%)	115 (93.5)	8 (6.5)	123 (100.0)	14	17	154
4～ (%)	434 (92.5)	35 (7.5)	469 (100.0)	60	46	575
6～ (%)	823 (91.3)	78 (8.7)	901 (100.0)	131	101	1,133
8～ (%)	962 (90.9)	96 (9.1)	1,058 (100.0)	144	147	1,349
10～ (%)	785 (92.0)	68 (8.0)	853 (100.0)	122	140	1,115
12～ (%)	579 (87.3)	84 (12.7)	663 (100.0)	93	92	848
14～ (%)	306 (86.9)	46 (13.1)	352 (100.0)	65	71	488
16～ (%)	197 (87.2)	29 (12.8)	226 (100.0)	28	41	295
合計 (%)	4,214 (90.4)	445 (9.6)	4,659 (100.0)	657	658	5,974
記載なし (%)	530 (93.1)	39 (6.9)	569 (100.0)	77	2,321	2,967
総計 (%)	4,744 (90.7)	484 (9.3)	5,228 (100.0)	734	2,979	8,941
平均	9.74	10.46	9.81	9.95	10.37	9.89
標準偏差	3.52	3.65	3.54	3.40	3.56	3.53

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査