

表 1678 喫煙の有無 アルブミン濃度(g/dL)別 (腹膜透析患者)

アルブミン濃度	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
1.5未満 (%)	9 (90.0)	1 (10.0)	10 (100.0)		5	15
1.5～ (%)	51 (91.1)	5 (8.9)	56 (100.0)	6	9	71
2.0～ (%)	224 (92.6)	18 (7.4)	242 (100.0)	25	31	298
2.5～ (%)	733 (90.4)	78 (9.6)	811 (100.0)	111	115	1,037
3.0～ (%)	1,507 (89.9)	169 (10.1)	1,676 (100.0)	243	239	2,158
3.5～ (%)	1,338 (91.0)	132 (9.0)	1,470 (100.0)	222	214	1,906
4.0～ (%)	308 (89.0)	38 (11.0)	346 (100.0)	41	44	431
4.5～ (%)	15 (100.0)		15 (100.0)	4	2	21
5.0～ (%)	2 (100.0)		2 (100.0)			2
合計 (%)	4,187 (90.5)	441 (9.5)	4,628 (100.0)	652	659	5,939
記載なし (%)	557 (92.8)	43 (7.2)	600 (100.0)	82	2,320	3,002
総計 (%)	4,744 (90.7)	484 (9.3)	5,228 (100.0)	734	2,979	8,941
平均	3.28	3.28	3.28	3.30	3.26	3.28
標準偏差	0.52	0.51	0.52	0.48	0.53	0.52

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査