

表 1679 喫煙の有無 CRP濃度(mg/dL)別 (腹膜透析患者)

| CRP濃度        | 現在吸っていない        | 現在吸っている      | 合計               | 不明   | 記載なし  | 総計    |
|--------------|-----------------|--------------|------------------|------|-------|-------|
| 0.2未満<br>(%) | 2,191<br>(91.6) | 200<br>(8.4) | 2,391<br>(100.0) | 349  | 327   | 3,067 |
| 0.2～<br>(%)  | 671<br>(87.9)   | 92<br>(12.1) | 763<br>(100.0)   | 112  | 120   | 995   |
| 0.5～<br>(%)  | 319<br>(93.5)   | 22<br>(6.5)  | 341<br>(100.0)   | 55   | 53    | 449   |
| 1.0～<br>(%)  | 217<br>(89.7)   | 25<br>(10.3) | 242<br>(100.0)   | 34   | 32    | 308   |
| 2.0～<br>(%)  | 134<br>(89.3)   | 16<br>(10.7) | 150<br>(100.0)   | 30   | 22    | 202   |
| 4.0～<br>(%)  | 54<br>(85.7)    | 9<br>(14.3)  | 63<br>(100.0)    | 11   | 9     | 83    |
| 6.0～<br>(%)  | 30<br>(93.8)    | 2<br>(6.3)   | 32<br>(100.0)    | 4    | 4     | 40    |
| 8.0～<br>(%)  | 17<br>(89.5)    | 2<br>(10.5)  | 19<br>(100.0)    | 4    | 1     | 24    |
| 10.0～<br>(%) | 24<br>(85.7)    | 4<br>(14.3)  | 28<br>(100.0)    | 4    | 2     | 34    |
| 15.0～<br>(%) | 6<br>(85.7)     | 1<br>(14.3)  | 7<br>(100.0)     |      |       | 7     |
| 合計<br>(%)    | 3,663<br>(90.8) | 373<br>(9.2) | 4,036<br>(100.0) | 603  | 570   | 5,209 |
| 記載なし<br>(%)  | 1,081<br>(90.7) | 111<br>(9.3) | 1,192<br>(100.0) | 131  | 2,409 | 3,732 |
| 総計<br>(%)    | 4,744<br>(90.7) | 484<br>(9.3) | 5,228<br>(100.0) | 734  | 2,979 | 8,941 |
| 平均           | 0.63            | 0.75         | 0.64             | 0.66 | 0.53  | 0.63  |
| 標準偏差         | 1.78            | 1.88         | 1.79             | 1.58 | 1.19  | 1.71  |

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査