

表 1680 喫煙の有無 補正カルシウム濃度(mg/dL)別（腹膜透析患者）

補正 カルシウム濃度	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
7.0未満 (%)	19 (73.1)	7 (26.9)	26 (100.0)	1	2	29
7.0～ (%)	26 (96.3)	1 (3.7)	27 (100.0)	5	4	36
7.5～ (%)	90 (89.1)	11 (10.9)	101 (100.0)	13	13	127
8.0～ (%)	201 (87.0)	30 (13.0)	231 (100.0)	24	31	286
8.4～ (%)	60 (88.2)	8 (11.8)	68 (100.0)	10	8	86
8.5～ (%)	650 (89.9)	73 (10.1)	723 (100.0)	87	96	906
9.0～ (%)	1,113 (90.4)	118 (9.6)	1,231 (100.0)	187	184	1,602
9.5～ (%)	1,132 (90.7)	116 (9.3)	1,248 (100.0)	199	182	1,629
10.0～ (%)	133 (87.5)	19 (12.5)	152 (100.0)	20	19	191
10.1～ (%)	392 (93.3)	28 (6.7)	420 (100.0)	66	71	557
10.5～ (%)	220 (91.3)	21 (8.7)	241 (100.0)	25	30	296
11.0～ (%)	86 (94.5)	5 (5.5)	91 (100.0)	11	9	111
11.5～ (%)	24 (92.3)	2 (7.7)	26 (100.0)	1	2	29
12.0～ (%)	21 (100.0)		21 (100.0)	2	4	27
合計 (%)	4,167 (90.5)	439 (9.5)	4,606 (100.0)	651	655	5,912
記載なし (%)	577 (92.8)	45 (7.2)	622 (100.0)	83	2,324	3,029
総計 (%)	4,744 (90.7)	484 (9.3)	5,228 (100.0)	734	2,979	8,941
平均	9.41	9.27	9.40	9.42	9.43	9.41
標準偏差	0.80	0.86	0.81	0.72	0.78	0.80

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査