

表 1681 喫煙の有無 リン濃度(mg/dL)別（腹膜透析患者）

リン濃度	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
3未満	91	7	98	12	16	126
(%)	(92.9)	(7.1)	(100.0)			
3.0～	198	18	216	24	30	270
(%)	(91.7)	(8.3)	(100.0)			
3.5～	373	35	408	66	51	525
(%)	(91.4)	(8.6)	(100.0)			
4.0～	544	57	601	82	87	770
(%)	(90.5)	(9.5)	(100.0)			
4.5～	680	68	748	96	77	921
(%)	(90.9)	(9.1)	(100.0)			
5.0～	674	60	734	101	113	948
(%)	(91.8)	(8.2)	(100.0)			
5.5～	610	65	675	80	84	839
(%)	(90.4)	(9.6)	(100.0)			
6.0～	102	8	110	14	14	138
(%)	(92.7)	(7.3)	(100.0)			
6.1～	311	39	350	64	63	477
(%)	(88.9)	(11.1)	(100.0)			
6.5～	259	44	303	42	54	399
(%)	(85.5)	(14.5)	(100.0)			
7.0～	150	11	161	27	24	212
(%)	(93.2)	(6.8)	(100.0)			
7.5～	98	12	110	22	17	149
(%)	(89.1)	(10.9)	(100.0)			
8.0～	44	5	49	8	14	71
(%)	(89.8)	(10.2)	(100.0)			
8.5～	20	8	28	5	5	38
(%)	(71.4)	(28.6)	(100.0)			
9.0～	55	8	63	10	16	89
(%)	(87.3)	(12.7)	(100.0)			
合計	4,209	445	4,654	653	665	5,972
(%)	(90.4)	(9.6)	(100.0)			
記載なし	535	39	574	81	2,314	2,969
(%)	(93.2)	(6.8)	(100.0)			
総計	4,744	484	5,228	734	2,979	8,941
(%)	(90.7)	(9.3)	(100.0)			
平均	5.20	5.39	5.22	5.30	5.36	5.25
標準偏差	1.32	1.37	1.32	1.38	1.47	1.35

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査