

表 1683 喫煙の有無 PTH値(pg/mL)別 (腹膜透析患者) PTH測定法:whole-PTH

PTH値	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	35 (89.7)	4 (10.3)	39 (100.0)	1		40
20~ (%)	36 (80.0)	9 (20.0)	45 (100.0)			45
35~ (%)	47 (92.2)	4 (7.8)	51 (100.0)	3	1	55
50~ (%)	65 (90.3)	7 (9.7)	72 (100.0)	2	3	77
75~ (%)	62 (93.9)	4 (6.1)	66 (100.0)	2	1	69
100~ (%)	66 (94.3)	4 (5.7)	70 (100.0)	1		71
125~ (%)	37 (92.5)	3 (7.5)	40 (100.0)	5		45
150~ (%)	1 (100.0)		1 (100.0)			1
151~ (%)	33 (84.6)	6 (15.4)	39 (100.0)	2	2	43
180~ (%)	30 (96.8)	1 (3.2)	31 (100.0)	1	2	34
210~ (%)	18 (78.3)	5 (21.7)	23 (100.0)	4		27
240~ (%)	19 (86.4)	3 (13.6)	22 (100.0)	1		23
300~ (%)	15 (93.8)	1 (6.3)	16 (100.0)	3		19
350~ (%)	7 (100.0)		7 (100.0)		1	8
400~ (%)	7 (100.0)		7 (100.0)	4		11
500~ (%)	9 (90.0)	1 (10.0)	10 (100.0)	1		11
合計 (%)	487 (90.4)	52 (9.6)	539 (100.0)	30	10	579
記載なし (%)	94 (86.2)	15 (13.8)	109 (100.0)	4	27	140
総計 (%)	581 (89.7)	67 (10.3)	648 (100.0)	34	37	719
平均	129.06	118.04	128.00	211.00	142.90	132.56
標準偏差	129.29	103.48	126.99	156.64	101.42	129.39

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査