

表 1684 喫煙の有無 ヘモグロビン濃度(g/dL)別 (腹膜透析患者)

ヘモグロビン濃度	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
5未満 (%)	5 (100.0)		5 (100.0)	2		7
5～ (%)	11 (100.0)		11 (100.0)	2	1	14
6～ (%)	21 (87.5)	3 (12.5)	24 (100.0)	2	2	28
7～ (%)	78 (89.7)	9 (10.3)	87 (100.0)	18	19	124
8～ (%)	234 (89.7)	27 (10.3)	261 (100.0)	39	44	344
9～ (%)	641 (90.9)	64 (9.1)	705 (100.0)	108	90	903
10～ (%)	1,181 (90.1)	130 (9.9)	1,311 (100.0)	185	210	1,706
11～ (%)	1,244 (92.1)	106 (7.9)	1,350 (100.0)	186	173	1,709
12～ (%)	559 (88.7)	71 (11.3)	630 (100.0)	80	86	796
13～ (%)	158 (87.3)	23 (12.7)	181 (100.0)	20	36	237
14～ (%)	58 (90.6)	6 (9.4)	64 (100.0)	7	8	79
合計 (%)	4,190 (90.5)	439 (9.5)	4,629 (100.0)	649	669	5,947
記載なし (%)	554 (92.5)	45 (7.5)	599 (100.0)	85	2,310	2,994
総計 (%)	4,744 (90.7)	484 (9.3)	5,228 (100.0)	734	2,979	8,941
平均	10.82	10.87	10.82	10.72	10.82	10.81
標準偏差	1.42	1.40	1.42	1.42	1.41	1.42

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査