

表 1685 喫煙の有無 総コレステロール濃度(mg/dL)別（腹膜透析患者）

総コレステロール濃度	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
100未満 (%)	32 (94.1)	2 (5.9)	34 (100.0)	8	8	50
100～ (%)	106 (88.3)	14 (11.7)	120 (100.0)	16	24	160
120～ (%)	319 (86.2)	51 (13.8)	370 (100.0)	46	32	448
140～ (%)	531 (87.9)	73 (12.1)	604 (100.0)	93	109	806
160～ (%)	608 (91.2)	59 (8.8)	667 (100.0)	101	97	865
180～ (%)	610 (91.0)	60 (9.0)	670 (100.0)	81	82	833
200～ (%)	395 (93.6)	27 (6.4)	422 (100.0)	77	65	564
220～ (%)	227 (92.3)	19 (7.7)	246 (100.0)	37	35	318
240～ (%)	117 (92.1)	10 (7.9)	127 (100.0)	10	22	159
260～ (%)	107 (93.9)	7 (6.1)	114 (100.0)	17	18	149
合計 (%)	3,052 (90.5)	322 (9.5)	3,374 (100.0)	486	492	4,352
記載なし (%)	1,692 (91.3)	162 (8.7)	1,854 (100.0)	248	2,487	4,589
総計 (%)	4,744 (90.7)	484 (9.3)	5,228 (100.0)	734	2,979	8,941
平均	179.95	171.11	179.11	178.32	179.03	179.01
標準偏差	40.82	38.75	40.70	38.53	41.38	40.54

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査