

表 1686 喫煙の有無 HDL-C濃度(mg/dL)別 (腹膜透析患者)

HDL-C濃度	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	5 (71.4)	2 (28.6)	7 (100.0)		1	8
20~ (%)	189 (86.3)	30 (13.7)	219 (100.0)	37	32	288
30~ (%)	663 (90.5)	70 (9.5)	733 (100.0)	98	102	933
40~ (%)	660 (88.4)	87 (11.6)	747 (100.0)	118	125	990
50~ (%)	573 (89.1)	70 (10.9)	643 (100.0)	93	103	839
60~ (%)	378 (93.6)	26 (6.4)	404 (100.0)	54	58	516
70~ (%)	185 (93.0)	14 (7.0)	199 (100.0)	32	28	259
80~ (%)	84 (87.5)	12 (12.5)	96 (100.0)	25	20	141
90~ (%)	42 (93.3)	3 (6.7)	45 (100.0)	10	6	61
100~ (%)	41 (93.2)	3 (6.8)	44 (100.0)	10	3	57
合計 (%)	2,820 (89.9)	317 (10.1)	3,137 (100.0)	477	478	4,092
記載なし (%)	1,924 (92.0)	167 (8.0)	2,091 (100.0)	257	2,501	4,849
総計 (%)	4,744 (90.7)	484 (9.3)	5,228 (100.0)	734	2,979	8,941
平均	50.55	48.02	50.29	52.05	50.10	50.47
標準偏差	17.68	16.58	17.59	19.99	16.07	17.72

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査