

表 1687 喫煙の有無 Non-HDL-C濃度(mg/dL)別 (腹膜透析患者)

Non-HDL-C濃度	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
50未満 (%)	12 (85.7)	2 (14.3)	14 (100.0)	2	2	18
50～ (%)	70 (80.5)	17 (19.5)	87 (100.0)	13	14	114
70～ (%)	236 (86.4)	37 (13.6)	273 (100.0)	40	38	351
90～ (%)	452 (88.6)	58 (11.4)	510 (100.0)	83	67	660
110～ (%)	564 (90.5)	59 (9.5)	623 (100.0)	77	97	797
130～ (%)	466 (91.9)	41 (8.1)	507 (100.0)	76	79	662
150～ (%)	297 (91.4)	28 (8.6)	325 (100.0)	55	56	436
170～ (%)	195 (92.4)	16 (7.6)	211 (100.0)	30	22	263
190～ (%)	82 (86.3)	13 (13.7)	95 (100.0)	14	11	120
210～ (%)	63 (92.6)	5 (7.4)	68 (100.0)	10	12	90
合計 (%)	2,437 (89.8)	276 (10.2)	2,713 (100.0)	400	398	3,511
記載なし (%)	2,307 (91.7)	208 (8.3)	2,515 (100.0)	334	2,581	5,430
総計 (%)	4,744 (90.7)	484 (9.3)	5,228 (100.0)	734	2,979	8,941
平均	129.15	122.66	128.49	128.25	128.55	128.47
標準偏差	37.82	40.27	38.12	37.02	38.36	38.01

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査