

表 1688 喫煙の有無 収縮期血圧(mmHg)別 (腹膜透析患者)

収縮期血圧	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
60未満 (%)	1 (100.0)		1 (100.0)			1
60～ (%)	13 (100.0)		13 (100.0)			13
80～ (%)	92 (95.8)	4 (4.2)	96 (100.0)	12	16	124
100～ (%)	483 (92.0)	42 (8.0)	525 (100.0)	64	52	641
120～ (%)	1,150 (91.2)	111 (8.8)	1,261 (100.0)	142	113	1,516
140～ (%)	1,133 (89.4)	134 (10.6)	1,267 (100.0)	181	131	1,579
160～ (%)	496 (87.8)	69 (12.2)	565 (100.0)	81	75	721
180～ (%)	137 (82.5)	29 (17.5)	166 (100.0)	31	20	217
200～ (%)	21 (84.0)	4 (16.0)	25 (100.0)	3	3	31
220～ (%)	6 (85.7)	1 (14.3)	7 (100.0)	2	1	10
合計 (%)	3,532 (90.0)	394 (10.0)	3,926 (100.0)	516	411	4,853
記載なし (%)	1,212 (93.1)	90 (6.9)	1,302 (100.0)	218	2,568	4,088
総計 (%)	4,744 (90.7)	484 (9.3)	5,228 (100.0)	734	2,979	8,941
平均	139.84	145.29	140.39	144.11	143.07	141.01
標準偏差	22.64	22.91	22.72	22.91	23.92	22.88

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査