

表 1689 喫煙の有無 拡張期血圧(mmHg)別 (腹膜透析患者)

拡張期血圧	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	1 (100.0)		1 (100.0)			1
20～ (%)	14 (100.0)		14 (100.0)		1	15
40～ (%)	275 (92.0)	24 (8.0)	299 (100.0)	36	40	375
60～ (%)	1,554 (91.4)	147 (8.6)	1,701 (100.0)	205	159	2,065
80～ (%)	906 (88.7)	115 (11.3)	1,021 (100.0)	151	124	1,296
90～ (%)	512 (89.2)	62 (10.8)	574 (100.0)	88	52	714
100～ (%)	240 (86.0)	39 (14.0)	279 (100.0)	34	34	347
120～ (%)	8 (57.1)	6 (42.9)	14 (100.0)	2	2	18
140～ (%)	1 (100.0)		1 (100.0)			1
合計 (%)	3,511 (89.9)	393 (10.1)	3,904 (100.0)	516	412	4,832
記載なし (%)	1,233 (93.1)	91 (6.9)	1,324 (100.0)	218	2,567	4,109
総計 (%)	4,744 (90.7)	484 (9.3)	5,228 (100.0)	734	2,979	8,941
平均	78.46	81.91	78.81	80.37	79.29	79.01
標準偏差	14.39	15.05	14.49	13.74	14.64	14.43

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査