

表 1690 喫煙の有無 脈拍(拍/分)別 (腹膜透析患者)

脈拍	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
40未満 (%)	4 (100.0)		4 (100.0)		1	5
40～ (%)	14 (73.7)	5 (26.3)	19 (100.0)	4	2	25
50～ (%)	141 (94.0)	9 (6.0)	150 (100.0)	21	16	187
60～ (%)	636 (90.6)	66 (9.4)	702 (100.0)	71	77	850
70～ (%)	926 (90.1)	102 (9.9)	1,028 (100.0)	126	117	1,271
80～ (%)	741 (89.3)	89 (10.7)	830 (100.0)	93	101	1,024
90～ (%)	345 (88.0)	47 (12.0)	392 (100.0)	45	44	481
100～ (%)	137 (87.3)	20 (12.7)	157 (100.0)	25	22	204
110～ (%)	42 (95.5)	2 (4.5)	44 (100.0)	5	3	52
120～ (%)	19 (100.0)		19 (100.0)		1	20
合計 (%)	3,005 (89.8)	340 (10.2)	3,345 (100.0)	390	384	4,119
記載なし (%)	1,739 (92.4)	144 (7.6)	1,883 (100.0)	344	2,595	4,822
総計 (%)	4,744 (90.7)	484 (9.3)	5,228 (100.0)	734	2,979	8,941
平均	77.98	78.67	78.05	78.14	78.39	78.09
標準偏差	13.31	12.77	13.25	13.52	13.15	13.27

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査