

表 1691 腹膜透析の経験 治療方法別（透析患者全体）

治療方法	なし	あり(年末時点でカテーテルあり)	あり(年末時点でカテーテルなし)	合計	不明	記載なし	総計
施設血液透析 (%)	184,924 (96.6)	981 (0.5)	5,488 (2.9)	191,393 (100.0)	742	63,506	255,641
血液透析濾過 (%)	31,330 (95.2)	155 (0.5)	1,422 (4.3)	32,907 (100.0)	148	10,228	43,283
血液濾過 (%)	29 (96.7)	1 (3.3)		30 (100.0)		62	92
血液吸着透析 (%)	1,235 (95.0)	4 (0.3)	61 (4.7)	1,300 (100.0)	2	328	1,630
在宅血液透析 (%)	293 (79.2)	8 (2.2)	69 (18.6)	370 (100.0)	1	150	521
腹膜透析 (%)		6,256 (99.3)	46 (0.7)	6,302 (100.0)	6	2,633	8,941
合計 (%)	217,811 (93.8)	7,405 (3.2)	7,086 (3.1)	232,302 (100.0)	899	76,907	310,108
記載なし (%)							
総計 (%)	217,811 (93.8)	7,405 (3.2)	7,086 (3.1)	232,302 (100.0)	899	76,907	310,108

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査