

表 1693 腹膜透析の経験 併用の状況別（透析患者全体）

併用の状況	なし	あり(年末時点でカテーテルあり)	あり(年末時点でカテーテルなし)	合計	不明	記載なし	総計
HD(F)単独 (%)	217,793 (96.5)	873 (0.4)	7,021 (3.1)	225,687 (100.0)	884	74,223	300,794
PD単独 (%)		4,919 (99.5)	27 (0.5)	4,946 (100.0)	4	2,238	7,188
HD(F)単独.PDカテーテルあり (%)	14 (6.0)	205 (88.0)	14 (6.0)	233 (100.0)		36	269
PD.HD併用週1 HD(F) (%)		1,162 (98.6)	16 (1.4)	1,178 (100.0)	1	365	1,544
PD.HD併用週2 HD(F) (%)		152 (98.1)	3 (1.9)	155 (100.0)		22	177
PD.HD併用週3 HD(F) (%)		32 (94.1)	2 (5.9)	34 (100.0)		6	40
PD.HD併用週4 HD(F) (%)		1 (100.0)		1 (100.0)			1
PD.HD併用その他 (%)		59 (95.2)	3 (4.8)	62 (100.0)		11	73
合計 (%)	217,807 (93.8)	7,403 (3.2)	7,086 (3.1)	232,296 (100.0)	889	76,901	310,086
不明 (%)	4 (66.7)	2 (33.3)		6 (100.0)	10	6	22
記載なし (%)							
総計 (%)	217,811 (93.8)	7,405 (3.2)	7,086 (3.1)	232,302 (100.0)	899	76,907	310,108

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査