

表 1697 腹膜透析の経験 原疾患別（透析患者全体）

原疾患	なし	あり(年末時点でカテーテルあり)	あり(年末時点でカテーテルなし)	合計	不明	記載なし	総計
慢性糸球体腎炎 (%)	66,512 (91.5)	2,645 (3.6)	3,568 (4.9)	72,725 (100.0)	283	23,962	96,970
慢性腎盂腎炎 (%)	2,057 (91.1)	87 (3.9)	113 (5.0)	2,257 (100.0)	17	768	3,042
急速進行性糸球体腎炎 (%)	1,761 (94.2)	62 (3.3)	47 (2.5)	1,870 (100.0)	9	615	2,494
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)	1,128 (92.9)	36 (3.0)	50 (4.1)	1,214 (100.0)	4	396	1,614
その他の分類不能の腎炎 (%)	906 (90.0)	61 (6.1)	40 (4.0)	1,007 (100.0)	3	363	1,373
多発性嚢胞腎 (%)	8,039 (95.6)	204 (2.4)	162 (1.9)	8,405 (100.0)	31	2,570	11,006
腎硬化症 (%)	20,262 (93.8)	878 (4.1)	465 (2.2)	21,605 (100.0)	79	6,614	28,298
悪性高血圧 (%)	1,762 (92.3)	85 (4.5)	63 (3.3)	1,910 (100.0)	4	659	2,573
糖尿病性腎症 (%)	84,459 (95.8)	2,189 (2.5)	1,536 (1.7)	88,184 (100.0)	332	29,565	118,081
SLE腎炎 (%)	1,605 (93.4)	56 (3.3)	57 (3.3)	1,718 (100.0)	8	510	2,236
アミロイド腎 (%)	321 (95.3)	5 (1.5)	11 (3.3)	337 (100.0)	1	113	451
痛風腎 (%)	795 (91.6)	34 (3.9)	39 (4.5)	868 (100.0)	2	243	1,113
先天性代謝異常による腎不全 (%)	180 (84.5)	18 (8.5)	15 (7.0)	213 (100.0)		59	272
腎・尿路結核 (%)	143 (94.7)	1 (0.7)	7 (4.6)	151 (100.0)	1	54	206
腎・尿路結石 (%)	415 (95.2)	13 (3.0)	8 (1.8)	436 (100.0)	2	143	581
腎・尿路腫瘍 (%)	640 (96.7)	10 (1.5)	12 (1.8)	662 (100.0)	2	222	886
閉塞性尿路障害 (%)	529 (93.8)	19 (3.4)	16 (2.8)	564 (100.0)	2	157	723
骨髄腫 (%)	209 (96.8)	6 (2.8)	1 (0.5)	216 (100.0)		60	276
腎形成不全 (%)	377 (75.0)	71 (14.1)	55 (10.9)	503 (100.0)	2	144	649
不明 (%)	19,064 (94.0)	666 (3.3)	552 (2.7)	20,282 (100.0)	103	7,159	27,544
再導入 (%)	1,538 (90.2)	57 (3.3)	111 (6.5)	1,706 (100.0)	4	453	2,163
その他 (%)	5,109 (93.4)	202 (3.7)	158 (2.9)	5,469 (100.0)	10	2,078	7,557
合計 (%)	217,811 (93.8)	7,405 (3.2)	7,086 (3.1)	232,302 (100.0)	899	76,907	310,108
記載なし (%)							
総計 (%)	217,811 (93.8)	7,405 (3.2)	7,086 (3.1)	232,302 (100.0)	899	76,907	310,108

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査