

表 1700 腹膜透析の経験 週透析回数(回/週)別 (透析患者全体)

週透析回数	なし	あり(年末時点でカテーテルあり)	あり(年末時点でカテーテルなし)	合計	不明	記載なし	総計
1回 (%)	443 (28.2)	1,106 (70.3)	24 (1.5)	1,573 (100.0)	1	266	1,840
2回 (%)	4,754 (95.9)	164 (3.3)	39 (0.8)	4,957 (100.0)	14	1,221	6,192
3回 (%)	210,403 (96.4)	1,037 (0.5)	6,777 (3.1)	218,217 (100.0)	874	51,548	270,639
4回 (%)	768 (91.1)	10 (1.2)	65 (7.7)	843 (100.0)		151	994
5回 (%)	64 (79.0)	1 (1.2)	16 (19.8)	81 (100.0)		8	89
6回 (%)	41 (70.7)		17 (29.3)	58 (100.0)		23	81
7回 (%)	25 (83.3)	1 (3.3)	4 (13.3)	30 (100.0)			30
合計 (%)	216,498 (95.9)	2,319 (1.0)	6,942 (3.1)	225,759 (100.0)	889	53,217	279,865
記載なし (%)	1,313 (20.1)	5,086 (77.7)	144 (2.2)	6,543 (100.0)	10	23,690	30,243
総計 (%)	217,811 (93.8)	7,405 (3.2)	7,086 (3.1)	232,302 (100.0)	899	76,907	310,108
平均	2.98	1.98	3.01	2.97	2.98	2.97	2.97
標準偏差	0.19	0.98	0.26	0.24	0.14	0.22	0.24

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査