

表 1701 腹膜透析の経験 身長(cm)別（透析患者全体）

身長	なし	あり(年末時点でカテーテルあり)	あり(年末時点でカテーテルなし)	合計	不明	記載なし	総計
130未満 (%)	233 (76.9)	61 (20.1)	9 (3.0)	303 (100.0)	2	49	354
130～ (%)	563 (94.6)	12 (2.0)	20 (3.4)	595 (100.0)		101	696
135～ (%)	2,221 (95.2)	63 (2.7)	50 (2.1)	2,334 (100.0)	7	496	2,837
140～ (%)	7,977 (95.2)	218 (2.6)	187 (2.2)	8,382 (100.0)	38	1,877	10,297
145～ (%)	18,300 (95.1)	455 (2.4)	489 (2.5)	19,244 (100.0)	62	4,367	23,673
150～ (%)	29,149 (94.4)	882 (2.9)	848 (2.7)	30,879 (100.0)	126	7,230	38,235
155～ (%)	34,116 (94.1)	1,065 (2.9)	1,080 (3.0)	36,261 (100.0)	118	8,093	44,472
160～ (%)	40,898 (94.1)	1,326 (3.1)	1,233 (2.8)	43,457 (100.0)	147	10,046	53,650
165～ (%)	36,327 (93.4)	1,253 (3.2)	1,325 (3.4)	38,905 (100.0)	121	8,962	47,988
170～ (%)	23,298 (92.6)	901 (3.6)	952 (3.8)	25,151 (100.0)	88	5,835	31,074
175～ (%)	8,480 (92.2)	356 (3.9)	366 (4.0)	9,202 (100.0)	28	2,089	11,319
180～ (%)	2,243 (92.3)	88 (3.6)	99 (4.1)	2,430 (100.0)	6	543	2,979
185～ (%)	341 (92.2)	15 (4.1)	14 (3.8)	370 (100.0)	3	92	465
190～ (%)	56 (91.8)	2 (3.3)	3 (4.9)	61 (100.0)	1	15	77
合計 (%)	204,202 (93.9)	6,697 (3.1)	6,675 (3.1)	217,574 (100.0)	747	49,795	268,116
記載なし (%)	13,609 (92.4)	708 (4.8)	411 (2.8)	14,728 (100.0)	152	27,112	41,992
総計 (%)	217,811 (93.8)	7,405 (3.2)	7,086 (3.1)	232,302 (100.0)	899	76,907	310,108
平均	159.97	160.60	161.41	160.03	159.58	160.12	160.05
標準偏差	9.60	11.35	9.60	9.66	10.29	9.59	9.65

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査