

表 1702 腹膜透析の経験 Body Mass Index別（透析患者全体）

Body Mass Index	なし	あり(年末時点でカテーテルあり)	あり(年末時点でカテーテルなし)	合計	不明	記載なし	総計
14未満 (%)	1,224 (94.6)	32 (2.5)	38 (2.9)	1,294 (100.0)	7	285	1,586
14～ (%)	7,230 (95.7)	104 (1.4)	217 (2.9)	7,551 (100.0)	35	1,604	9,190
16～ (%)	23,762 (95.3)	347 (1.4)	820 (3.3)	24,929 (100.0)	95	5,199	30,223
18～ (%)	42,073 (94.9)	785 (1.8)	1,465 (3.3)	44,323 (100.0)	166	9,368	53,857
20～ (%)	46,431 (94.1)	1,321 (2.7)	1,589 (3.2)	49,341 (100.0)	153	10,426	59,920
22～ (%)	35,790 (93.6)	1,322 (3.5)	1,137 (3.0)	38,249 (100.0)	117	8,055	46,421
24～ (%)	21,449 (93.0)	946 (4.1)	661 (2.9)	23,056 (100.0)	65	4,845	27,966
26～ (%)	11,372 (92.7)	571 (4.7)	324 (2.6)	12,267 (100.0)	29	2,633	14,929
28～ (%)	5,906 (92.4)	315 (4.9)	172 (2.7)	6,393 (100.0)	16	1,307	7,716
30～ (%)	5,141 (93.6)	221 (4.0)	132 (2.4)	5,494 (100.0)	19	1,098	6,611
合計 (%)	200,378 (94.1)	5,964 (2.8)	6,555 (3.1)	212,897 (100.0)	702	44,820	258,419
記載なし (%)	17,433 (89.8)	1,441 (7.4)	531 (2.7)	19,405 (100.0)	197	32,087	51,689
総計 (%)	217,811 (93.8)	7,405 (3.2)	7,086 (3.1)	232,302 (100.0)	899	76,907	310,108
平均	21.48	22.83	21.28	21.51	20.98	21.50	21.51
標準偏差	3.66	3.66	3.51	3.66	3.62	3.64	3.66

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査