

表 1703 腹膜透析の経験 糖尿病の有無別（透析患者全体）

糖尿病の有無	なし	あり(年末時点でカテーテルあり)	あり(年末時点でカテーテルなし)	合計	不明	記載なし	総計
糖尿病なし (%)	109,349 (92.6)	4,081 (3.5)	4,654 (3.9)	118,084 (100.0)	418	11,356	129,858
糖尿病あり (%)	100,748 (95.5)	2,829 (2.7)	1,943 (1.8)	105,520 (100.0)	448	33,285	139,253
合計 (%)	210,097 (94.0)	6,910 (3.1)	6,597 (3.0)	223,604 (100.0)	866	44,641	269,111
不明 (%)	7,714 (88.7)	495 (5.7)	489 (5.6)	8,698 (100.0)	33	32,266	40,997
記載なし (%)							
総計 (%)	217,811 (93.8)	7,405 (3.2)	7,086 (3.1)	232,302 (100.0)	899	76,907	310,108

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

*糖尿病ありとは、原疾患が糖尿病性腎症または、糖尿病の既往がありの患者。

糖尿病なしとは、原疾患が糖尿病性腎症以外で且つ糖尿病の既往がなしの患者。

記載なしとは、原疾患と糖尿病の既往いずれも記載のなかった患者。

不明とは、上記以外。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査