

表 1704 腹膜透析の経験 透析前アルブミン濃度(g/dL)別(透析患者全体)

透析前アルブミン濃度	なし	あり(年末時点でカテーテルあり)	あり(年末時点でカテーテルなし)	合計	不明	記載なし	総計
1.5未満 (%)	140 (88.1)	16 (10.1)	3 (1.9)	159 (100.0)		26	185
1.5～ (%)	724 (89.3)	71 (8.8)	16 (2.0)	811 (100.0)	9	169	989
2.0～ (%)	2,982 (89.7)	284 (8.5)	57 (1.7)	3,323 (100.0)	17	721	4,061
2.5～ (%)	11,316 (89.9)	1,003 (8.0)	264 (2.1)	12,583 (100.0)	100	2,753	15,436
3.0～ (%)	50,030 (93.3)	2,221 (4.1)	1,363 (2.5)	53,614 (100.0)	232	12,262	66,108
3.5～ (%)	103,715 (94.8)	2,213 (2.0)	3,507 (3.2)	109,435 (100.0)	326	25,474	135,235
4.0～ (%)	38,624 (94.9)	584 (1.4)	1,491 (3.7)	40,699 (100.0)	80	9,729	50,508
4.5～ (%)	2,249 (94.6)	36 (1.5)	92 (3.9)	2,377 (100.0)	6	531	2,914
5.0～ (%)	176 (96.7)	2 (1.1)	4 (2.2)	182 (100.0)		21	203
合計 (%)	209,956 (94.1)	6,430 (2.9)	6,797 (3.0)	223,183 (100.0)	770	51,686	275,639
記載なし (%)	7,855 (86.1)	975 (10.7)	289 (3.2)	9,119 (100.0)	129	25,221	34,469
総計 (%)	217,811 (93.8)	7,405 (3.2)	7,086 (3.1)	232,302 (100.0)	899	76,907	310,108
平均	3.60	3.33	3.67	3.60	3.42	3.60	3.60
標準偏差	0.44	0.52	0.41	0.44	0.49	0.44	0.44

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査