

表 1705 腹膜透析の経験 透析前CRP濃度(mg/dL)別 (透析患者全体)

透析前CRP濃度	なし	あり(年末時点でカテーテルあり)	あり(年末時点でカテーテルなし)	合計	不明	記載なし	総計
0.2未満 (%)	103,832 (93.8)	3,344 (3.0)	3,534 (3.2)	110,710 (100.0)	392	24,207	135,309
0.2～ (%)	34,826 (94.1)	1,077 (2.9)	1,098 (3.0)	37,001 (100.0)	116	7,690	44,807
0.5～ (%)	17,522 (94.5)	495 (2.7)	531 (2.9)	18,548 (100.0)	74	4,135	22,757
1.0～ (%)	11,458 (94.4)	322 (2.7)	360 (3.0)	12,140 (100.0)	47	2,561	14,748
2.0～ (%)	6,935 (94.0)	229 (3.1)	210 (2.8)	7,374 (100.0)	35	1,596	9,005
4.0～ (%)	2,481 (93.5)	97 (3.7)	75 (2.8)	2,653 (100.0)	18	573	3,244
6.0～ (%)	1,212 (93.6)	42 (3.2)	41 (3.2)	1,295 (100.0)	6	275	1,576
8.0～ (%)	655 (92.9)	25 (3.5)	25 (3.5)	705 (100.0)	6	159	870
10.0～ (%)	805 (93.5)	39 (4.5)	17 (2.0)	861 (100.0)	6	167	1,034
15.0～ (%)	535 (94.7)	14 (2.5)	16 (2.8)	565 (100.0)	3	125	693
合計 (%)	180,261 (94.0)	5,684 (3.0)	5,907 (3.1)	191,852 (100.0)	703	41,488	234,043
記載なし	37,550	1,721	1,179	40,450	196	35,419	76,065
総計 (%)	217,811 (93.8)	7,405 (3.2)	7,086 (3.1)	232,302 (100.0)	899	76,907	310,108
平均	0.63	0.68	0.59	0.63	0.83	0.62	0.63
標準偏差	1.94	2.36	1.72	1.95	1.99	1.78	1.92

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査