

表 1706 腹膜透析の経験 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL)別（透析患者全体）

透析前補正 カルシウム濃度	なし	あり(年末時点でカテー テルあり)	あり(年末時点でカテー テルなし)	合計	不明	記載なし	総計
7.0未満 (%)	874 (93.4)	28 (3.0)	34 (3.6)	936 (100.0)	2	204	1,142
7.0～ (%)	1,280 (94.1)	39 (2.9)	41 (3.0)	1,360 (100.0)		289	1,649
7.5～ (%)	4,782 (94.6)	128 (2.5)	145 (2.9)	5,055 (100.0)	14	1,330	6,399
8.0～ (%)	15,568 (95.4)	324 (2.0)	434 (2.7)	16,326 (100.0)	42	4,071	20,439
8.4～ (%)	4,528 (94.6)	110 (2.3)	149 (3.1)	4,787 (100.0)	8	1,077	5,872
8.5～ (%)	51,871 (95.5)	1,016 (1.9)	1,452 (2.7)	54,339 (100.0)	179	12,801	67,319
9.0～ (%)	62,780 (94.3)	1,759 (2.6)	2,016 (3.0)	66,555 (100.0)	259	15,190	82,004
9.5～ (%)	40,711 (92.7)	1,742 (4.0)	1,455 (3.3)	43,908 (100.0)	140	9,921	53,969
10.0～ (%)	4,991 (92.1)	209 (3.9)	219 (4.0)	5,419 (100.0)	16	1,163	6,598
10.1～ (%)	12,745 (92.5)	581 (4.2)	455 (3.3)	13,781 (100.0)	49	3,147	16,977
10.5～ (%)	6,094 (91.9)	288 (4.3)	251 (3.8)	6,633 (100.0)	28	1,609	8,270
11.0～ (%)	2,037 (91.2)	113 (5.1)	83 (3.7)	2,233 (100.0)	13	535	2,781
11.5～ (%)	741 (92.3)	34 (4.2)	28 (3.5)	803 (100.0)	7	163	973
12.0～ (%)	514 (91.1)	29 (5.1)	21 (3.7)	564 (100.0)	3	114	681
合計 (%)	209,516 (94.1)	6,400 (2.9)	6,783 (3.0)	222,699 (100.0)	760	51,614	275,073
記載なし (%)	8,295 (86.4)	1,005 (10.5)	303 (3.2)	9,603 (100.0)	139	25,293	35,035
総計 (%)	217,811 (93.8)	7,405 (3.2)	7,086 (3.1)	232,302 (100.0)	899	76,907	310,108
平均	9.18	9.39	9.25	9.19	9.30	9.18	9.19
標準偏差	0.74	0.79	0.76	0.74	0.73	0.74	0.74

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査