

表 1707 腹膜透析の経験 透析前リン濃度(mg/dL)別（透析患者全体）

透析前リン濃度	なし	あり(年末時点でカテーテルあり)	あり(年末時点でカテーテルなし)	合計	不明	記載なし	総計
3未満 (%)	8,459 (96.2)	144 (1.6)	190 (2.2)	8,793 (100.0)	48	2,045	10,886
3.0～ (%)	10,398 (95.1)	294 (2.7)	246 (2.2)	10,938 (100.0)	43	2,601	13,582
3.5～ (%)	18,110 (94.5)	542 (2.8)	518 (2.7)	19,170 (100.0)	74	4,438	23,682
4.0～ (%)	27,050 (94.5)	822 (2.9)	761 (2.7)	28,633 (100.0)	118	6,531	35,282
4.5～ (%)	32,052 (94.0)	996 (2.9)	1,051 (3.1)	34,099 (100.0)	133	7,827	42,059
5.0～ (%)	32,310 (93.8)	1,021 (3.0)	1,125 (3.3)	34,456 (100.0)	124	8,138	42,718
5.5～ (%)	27,979 (93.8)	900 (3.0)	955 (3.2)	29,834 (100.0)	102	6,769	36,705
6.0～ (%)	4,717 (93.7)	156 (3.1)	159 (3.2)	5,032 (100.0)	13	1,216	6,261
6.1～ (%)	16,004 (93.9)	502 (2.9)	537 (3.2)	17,043 (100.0)	53	4,013	21,109
6.5～ (%)	13,827 (93.6)	460 (3.1)	492 (3.3)	14,779 (100.0)	50	3,449	18,278
7.0～ (%)	8,467 (94.0)	233 (2.6)	304 (3.4)	9,004 (100.0)	31	2,242	11,277
7.5～ (%)	5,145 (93.3)	161 (2.9)	209 (3.8)	5,515 (100.0)	23	1,320	6,858
8.0～ (%)	3,081 (94.3)	75 (2.3)	111 (3.4)	3,267 (100.0)	14	772	4,053
8.5～ (%)	1,931 (93.6)	48 (2.3)	83 (4.0)	2,062 (100.0)	7	503	2,572
9.0～ (%)	3,045 (93.1)	106 (3.2)	120 (3.7)	3,271 (100.0)	11	795	4,077
合計 (%)	212,575 (94.1)	6,460 (2.9)	6,861 (3.0)	225,896 (100.0)	844	52,659	279,399
記載なし (%)	5,236 (81.7)	945 (14.8)	225 (3.5)	6,406 (100.0)	55	24,248	30,709
総計 (%)	217,811 (93.8)	7,405 (3.2)	7,086 (3.1)	232,302 (100.0)	899	76,907	310,108
平均	5.20	5.27	5.37	5.21	5.09	5.23	5.21
標準偏差	1.42	1.37	1.42	1.42	1.46	1.44	1.43

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査