

表 1709 腹膜透析の経験 PTH値(pg/mL)別（透析患者全体）PTH測定法:whole-PTH

PTH値	なし	あり(年末時点でカテーテルあり)	あり(年末時点でカテーテルなし)	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	1,543 (93.5)	51 (3.1)	56 (3.4)	1,650 (100.0)	12	232	1,894
20～ (%)	1,884 (93.5)	52 (2.6)	80 (4.0)	2,016 (100.0)	10	305	2,331
35～ (%)	1,658 (92.6)	58 (3.2)	74 (4.1)	1,790 (100.0)	11	242	2,043
50～ (%)	2,543 (93.1)	85 (3.1)	104 (3.8)	2,732 (100.0)	5	416	3,153
75～ (%)	2,200 (93.0)	71 (3.0)	95 (4.0)	2,366 (100.0)	5	377	2,748
100～ (%)	1,800 (92.0)	73 (3.7)	83 (4.2)	1,956 (100.0)	9	333	2,298
125～ (%)	1,205 (91.6)	51 (3.9)	60 (4.6)	1,316 (100.0)	4	219	1,539
150～ (%)	36 (92.3)	1 (2.6)	2 (5.1)	39 (100.0)		9	48
151～ (%)	976 (90.0)	47 (4.3)	61 (5.6)	1,084 (100.0)	5	174	1,263
180～ (%)	695 (91.3)	36 (4.7)	30 (3.9)	761 (100.0)	3	111	875
210～ (%)	468 (89.3)	29 (5.5)	27 (5.2)	524 (100.0)	5	99	628
240～ (%)	504 (91.1)	25 (4.5)	24 (4.3)	553 (100.0)	4	117	674
300～ (%)	206 (86.9)	19 (8.0)	12 (5.1)	237 (100.0)	3	44	284
350～ (%)	139 (89.7)	9 (5.8)	7 (4.5)	155 (100.0)		24	179
400～ (%)	152 (89.9)	11 (6.5)	6 (3.6)	169 (100.0)	2	31	202
500～ (%)	168 (84.8)	11 (5.6)	19 (9.6)	198 (100.0)	9	40	247
合計 (%)	16,177 (92.2)	629 (3.6)	740 (4.2)	17,546 (100.0)	87	2,773	20,406
記載なし (%)	272 (68.2)	118 (29.6)	9 (2.3)	399 (100.0)	1	257	657
総計 (%)	16,449 (91.7)	747 (4.2)	749 (4.2)	17,945 (100.0)	88	3,030	21,063
平均	104.82	129.59	123.31	106.49	169.44	115.68	108.01
標準偏差	105.71	127.64	169.37	110.13	216.96	131.43	114.01

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査