

表 1711 腹膜透析の経験 総コレステロール濃度(mg/dL)別 (透析患者全体)

総コレステロール濃度	なし	あり(年末時点でカテーテルあり)	あり(年末時点でカテーテルなし)	合計	不明	記載なし	総計
100未満 (%)	6,131 (95.9)	69 (1.1)	193 (3.0)	6,393 (100.0)	35	1,402	7,830
100～ (%)	17,632 (96.1)	209 (1.1)	505 (2.8)	18,346 (100.0)	83	4,293	22,722
120～ (%)	32,550 (95.2)	590 (1.7)	1,055 (3.1)	34,195 (100.0)	136	7,870	42,201
140～ (%)	37,512 (94.6)	903 (2.3)	1,236 (3.1)	39,651 (100.0)	144	8,864	48,659
160～ (%)	30,879 (93.9)	921 (2.8)	1,074 (3.3)	32,874 (100.0)	119	7,250	40,243
180～ (%)	19,305 (92.5)	847 (4.1)	719 (3.4)	20,871 (100.0)	57	4,597	25,525
200～ (%)	10,196 (91.3)	568 (5.1)	398 (3.6)	11,162 (100.0)	36	2,525	13,723
220～ (%)	4,468 (90.6)	319 (6.5)	146 (3.0)	4,933 (100.0)	19	1,119	6,071
240～ (%)	1,758 (88.7)	155 (7.8)	70 (3.5)	1,983 (100.0)	4	413	2,400
260～ (%)	1,090 (86.6)	135 (10.7)	33 (2.6)	1,258 (100.0)	5	323	1,586
合計 (%)	161,521 (94.1)	4,716 (2.7)	5,429 (3.2)	171,666 (100.0)	638	38,656	210,960
記載なし (%)	56,290 (92.8)	2,689 (4.4)	1,657 (2.7)	60,636 (100.0)	261	38,251	99,148
総計 (%)	217,811 (93.8)	7,405 (3.2)	7,086 (3.1)	232,302 (100.0)	899	76,907	310,108
平均	155.29	175.40	157.54	155.92	151.42	155.68	155.86
標準偏差	35.40	40.55	35.16	35.70	36.25	35.89	35.74

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査