

表 1712 腹膜透析の経験 HDL-C濃度(mg/dL)別 (透析患者全体)

| HDL-C濃度 | なし | あり(年末時点でカテーテルあり) | あり(年末時点でカテーテルなし) | 合計 | 不明 | 記載なし | 総計 |
|-------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|-------|--------|---------|
| 20未満 (%) | 618 (95.7) | 13 (2.0) | 15 (2.3) | 646 (100.0) | 3 | 147 | 796 |
| 20～ (%) | 12,196 (94.9) | 314 (2.4) | 341 (2.7) | 12,851 (100.0) | 28 | 2,744 | 15,623 |
| 30～ (%) | 35,675 (94.6) | 985 (2.6) | 1,039 (2.8) | 37,699 (100.0) | 89 | 8,059 | 45,847 |
| 40～ (%) | 39,708 (94.3) | 1,078 (2.6) | 1,309 (3.1) | 42,095 (100.0) | 90 | 9,167 | 51,352 |
| 50～ (%) | 28,704 (93.7) | 913 (3.0) | 1,009 (3.3) | 30,626 (100.0) | 89 | 6,846 | 37,561 |
| 60～ (%) | 16,930 (93.2) | 575 (3.2) | 666 (3.7) | 18,171 (100.0) | 37 | 4,028 | 22,236 |
| 70～ (%) | 8,263 (93.1) | 278 (3.1) | 332 (3.7) | 8,873 (100.0) | 14 | 2,105 | 10,992 |
| 80～ (%) | 3,904 (92.4) | 156 (3.7) | 165 (3.9) | 4,225 (100.0) | 8 | 996 | 5,229 |
| 90～ (%) | 1,689 (92.7) | 65 (3.6) | 68 (3.7) | 1,822 (100.0) | 6 | 503 | 2,331 |
| 100～ (%) | 1,443 (92.2) | 67 (4.3) | 55 (3.5) | 1,565 (100.0) | 3 | 433 | 2,001 |
| 合計 (%) | 149,130 (94.0) | 4,444 (2.8) | 4,999 (3.2) | 158,573 (100.0) | 367 | 35,028 | 193,968 |
| 記載なし (%) | 68,681 (93.2) | 2,961 (4.0) | 2,087 (2.8) | 73,729 (100.0) | 532 | 41,879 | 116,140 |
| 総計 (%) | 217,811 (93.8) | 7,405 (3.2) | 7,086 (3.1) | 232,302 (100.0) | 899 | 76,907 | 310,108 |
| 平均 | 48.49 | 50.59 | 50.39 | 48.61 | 48.01 | 49.38 | 48.75 |
| 標準偏差 | 16.49 | 17.74 | 16.94 | 16.55 | 16.14 | 17.39 | 16.71 |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査