

表 1713 腹膜透析の経験 Non-HDL-C濃度(mg/dL)別（透析患者全体）

Non-HDL-C濃度	なし	あり(年末時点でカテーテルあり)	あり(年末時点でカテーテルなし)	合計	不明	記載なし	総計
50未満 (%)	2,650 (95.8)	29 (1.0)	87 (3.1)	2,766 (100.0)	7	637	3,410
50～ (%)	12,369 (95.8)	156 (1.2)	393 (3.0)	12,918 (100.0)	29	3,154	16,101
70～ (%)	27,276 (95.2)	468 (1.6)	921 (3.2)	28,665 (100.0)	71	6,833	35,569
90～ (%)	32,578 (94.6)	775 (2.2)	1,100 (3.2)	34,453 (100.0)	82	7,843	42,378
110～ (%)	26,221 (93.7)	849 (3.0)	916 (3.3)	27,986 (100.0)	66	6,151	34,203
130～ (%)	15,937 (93.0)	663 (3.9)	540 (3.2)	17,140 (100.0)	33	3,790	20,963
150～ (%)	7,911 (91.6)	449 (5.2)	277 (3.2)	8,637 (100.0)	16	1,937	10,590
170～ (%)	3,512 (90.4)	256 (6.6)	117 (3.0)	3,885 (100.0)	10	827	4,722
190～ (%)	1,326 (89.5)	120 (8.1)	35 (2.4)	1,481 (100.0)	2	326	1,809
210～ (%)	777 (88.6)	79 (9.0)	21 (2.4)	877 (100.0)	1	246	1,124
合計 (%)	130,557 (94.1)	3,844 (2.8)	4,407 (3.2)	138,808 (100.0)	317	31,744	170,869
記載なし (%)	87,254 (93.3)	3,561 (3.8)	2,679 (2.9)	93,494 (100.0)	582	45,163	139,239
総計 (%)	217,811 (93.8)	7,405 (3.2)	7,086 (3.1)	232,302 (100.0)	899	76,907	310,108
平均	106.74	124.72	106.91	107.24	104.30	106.42	107.08
標準偏差	33.29	37.96	32.28	33.53	31.51	33.96	33.61

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査