

表 1714 腹膜透析の経験 透析前収縮期血圧(mmHg)別（透析患者全体）

透析前収縮期血圧	なし	あり(年末時点でカテーテルあり)	あり(年末時点でカテーテルなし)	合計	不明	記載なし	総計
60未満 (%)	26 (86.7)	1 (3.3)	3 (10.0)	30 (100.0)	1	9	40
60～ (%)	330 (93.0)	14 (3.9)	11 (3.1)	355 (100.0)		78	433
80～ (%)	2,536 (92.0)	132 (4.8)	88 (3.2)	2,756 (100.0)	13	569	3,338
100～ (%)	13,411 (92.4)	649 (4.5)	458 (3.2)	14,518 (100.0)	66	3,023	17,607
120～ (%)	40,899 (93.0)	1,603 (3.6)	1,462 (3.3)	43,964 (100.0)	164	9,143	53,271
140～ (%)	62,441 (94.0)	1,788 (2.7)	2,215 (3.3)	66,444 (100.0)	207	14,171	80,822
160～ (%)	45,330 (95.3)	867 (1.8)	1,378 (2.9)	47,575 (100.0)	155	10,465	58,195
180～ (%)	17,294 (95.7)	282 (1.6)	501 (2.8)	18,077 (100.0)	76	4,071	22,224
200～ (%)	4,350 (96.4)	43 (1.0)	119 (2.6)	4,512 (100.0)	12	1,022	5,546
220～ (%)	887 (95.3)	16 (1.7)	28 (3.0)	931 (100.0)	8	221	1,160
合計 (%)	187,504 (94.1)	5,395 (2.7)	6,263 (3.1)	199,162 (100.0)	702	42,772	242,636
記載なし (%)	30,307 (91.5)	2,010 (6.1)	823 (2.5)	33,140 (100.0)	197	34,135	67,472
総計 (%)	217,811 (93.8)	7,405 (3.2)	7,086 (3.1)	232,302 (100.0)	899	76,907	310,108
平均	151.28	142.53	149.79	150.99	150.10	151.76	151.13
標準偏差	24.19	23.39	23.66	24.20	26.15	24.34	24.23

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査