

表 1715 腹膜透析の経験 透析前拡張期血圧(mmHg)別(透析患者全体)

透析前拡張期血圧	なし	あり(年末時点でカテーテルあり)	あり(年末時点でカテーテルなし)	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	66 (95.7)	1 (1.4)	2 (2.9)	69 (100.0)		11	80
20～ (%)	584 (93.3)	17 (2.7)	25 (4.0)	626 (100.0)	5	165	796
40～ (%)	16,003 (95.1)	421 (2.5)	404 (2.4)	16,828 (100.0)	63	3,589	20,480
60～ (%)	87,197 (94.7)	2,267 (2.5)	2,655 (2.9)	92,119 (100.0)	348	19,411	111,878
80～ (%)	45,925 (93.7)	1,444 (2.9)	1,631 (3.3)	49,000 (100.0)	167	10,520	59,687
90～ (%)	24,713 (93.3)	801 (3.0)	981 (3.7)	26,495 (100.0)	67	5,689	32,251
100～ (%)	11,899 (92.8)	399 (3.1)	520 (4.1)	12,818 (100.0)	46	2,907	15,771
120～ (%)	731 (93.4)	22 (2.8)	30 (3.8)	783 (100.0)	4	177	964
140～ (%)	54 (96.4)	1 (1.8)	1 (1.8)	56 (100.0)		19	75
合計 (%)	187,172 (94.2)	5,373 (2.7)	6,249 (3.1)	198,794 (100.0)	700	42,488	241,982
記載なし (%)	30,639 (91.4)	2,032 (6.1)	837 (2.5)	33,508 (100.0)	199	34,419	68,126
総計 (%)	217,811 (93.8)	7,405 (3.2)	7,086 (3.1)	232,302 (100.0)	899	76,907	310,108
平均	77.61	79.14	79.77	77.72	76.78	78.03	77.77
標準偏差	14.41	14.52	14.54	14.42	14.60	14.56	14.45

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査