

表 1716 腹膜透析の経験 透析前脈拍(拍/分)別 (透析患者全体)

| 透析前脈拍 | なし | あり(年末時点でカテーテルあり) | あり(年末時点でカテーテルなし) | 合計 | 不明 | 記載なし | 総計 |
|-------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|-------|--------|---------|
| 40未満 (%) | 143 (95.3) | 4 (2.7) | 3 (2.0) | 150 (100.0) | | 35 | 185 |
| 40～ (%) | 1,890 (96.2) | 32 (1.6) | 42 (2.1) | 1,964 (100.0) | 7 | 410 | 2,381 |
| 50～ (%) | 15,448 (95.3) | 253 (1.6) | 510 (3.1) | 16,211 (100.0) | 57 | 3,244 | 19,512 |
| 60～ (%) | 47,426 (94.7) | 1,001 (2.0) | 1,671 (3.3) | 50,098 (100.0) | 169 | 10,514 | 60,781 |
| 70～ (%) | 57,179 (94.6) | 1,457 (2.4) | 1,827 (3.0) | 60,463 (100.0) | 179 | 12,630 | 73,272 |
| 80～ (%) | 35,927 (93.9) | 1,114 (2.9) | 1,211 (3.2) | 38,252 (100.0) | 123 | 8,439 | 46,814 |
| 90～ (%) | 15,895 (94.1) | 514 (3.0) | 487 (2.9) | 16,896 (100.0) | 54 | 3,640 | 20,590 |
| 100～ (%) | 4,920 (92.6) | 224 (4.2) | 169 (3.2) | 5,313 (100.0) | 12 | 1,068 | 6,393 |
| 110～ (%) | 1,149 (92.5) | 55 (4.4) | 38 (3.1) | 1,242 (100.0) | 3 | 283 | 1,528 |
| 120～ (%) | 499 (93.4) | 22 (4.1) | 13 (2.4) | 534 (100.0) | 1 | 120 | 655 |
| 合計 (%) | 180,476 (94.4) | 4,676 (2.4) | 5,971 (3.1) | 191,123 (100.0) | 605 | 40,383 | 232,111 |
| 記載なし (%) | 37,335 (90.7) | 2,729 (6.6) | 1,115 (2.7) | 41,179 (100.0) | 294 | 36,524 | 77,997 |
| 総計 (%) | 217,811 (93.8) | 7,405 (3.2) | 7,086 (3.1) | 232,302 (100.0) | 899 | 76,907 | 310,108 |
| 平均 | 74.58 | 77.49 | 74.42 | 74.65 | 73.95 | 74.89 | 74.69 |
| 標準偏差 | 12.84 | 13.31 | 12.62 | 12.85 | 12.30 | 12.78 | 12.84 |

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査