

表 1718 腹膜透析の経験 年齢(歳)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

年齢	なし	あり(年末時点でカテーテルあり)	あり(年末時点でカテーテルなし)	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満	7		2	9		3	12
(%)	(77.8)		(22.2)	(100.0)			
15歳～	446	8	74	528		129	657
(%)	(84.5)	(1.5)	(14.0)	(100.0)			
30歳～	7,436	82	435	7,953	26	1,823	9,802
(%)	(93.5)	(1.0)	(5.5)	(100.0)			
45歳～	30,340	247	1,370	31,957	113	7,515	39,585
(%)	(94.9)	(0.8)	(4.3)	(100.0)			
60歳～	81,009	394	2,645	84,048	338	19,992	104,378
(%)	(96.4)	(0.5)	(3.1)	(100.0)			
75歳～	55,917	152	769	56,838	233	13,561	70,632
(%)	(98.4)	(0.3)	(1.4)	(100.0)			
90歳～	3,142	4	20	3,166	15	708	3,889
(%)	(99.2)	(0.1)	(0.6)	(100.0)			
合計	178,297	887	5,315	184,499	725	43,731	228,955
(%)	(96.6)	(0.5)	(2.9)	(100.0)			
不明	8			8		8	16
(%)	(100.0)			(100.0)			
記載なし							
(%)							
総計	178,305	887	5,315	184,507	725	43,739	228,971
(%)	(96.6)	(0.5)	(2.9)	(100.0)			
平均	68.27	62.53	62.13	68.07	68.90	68.15	68.08
標準偏差	12.29	13.00	12.50	12.35	11.87	12.20	12.32

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査