

表 1719 腹膜透析の経験 透析歴(年)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

透析歴	なし	あり(年末時点でカテーテルあり)	あり(年末時点でカテーテルなし)	合計	不明	記載なし	総計
2年未満 (%)	40,548 (98.9)	131 (0.3)	302 (0.7)	40,981 (100.0)	156	9,578	50,715
2年～ (%)	45,604 (97.6)	210 (0.4)	909 (1.9)	46,723 (100.0)	141	11,425	58,289
5年～ (%)	45,838 (96.0)	276 (0.6)	1,638 (3.4)	47,752 (100.0)	173	11,302	59,227
10年～ (%)	23,015 (94.9)	115 (0.5)	1,113 (4.6)	24,243 (100.0)	118	5,671	30,032
15年～ (%)	11,564 (93.9)	75 (0.6)	676 (5.5)	12,315 (100.0)	70	2,864	15,249
20年～ (%)	6,025 (93.2)	51 (0.8)	389 (6.0)	6,465 (100.0)	23	1,443	7,931
25年～ (%)	3,067 (94.3)	17 (0.5)	169 (5.2)	3,253 (100.0)	16	775	4,044
30年～ (%)	1,670 (95.5)	7 (0.4)	72 (4.1)	1,749 (100.0)	19	415	2,183
35年～ (%)	805 (96.9)	2 (0.2)	24 (2.9)	831 (100.0)	6	196	1,033
40年～ (%)	146 (85.4)	2 (1.2)	23 (13.5)	171 (100.0)	3	47	221
合計 (%)	178,282 (96.6)	886 (0.5)	5,315 (2.9)	184,483 (100.0)	725	43,716	228,924
不明 (%)	23 (95.8)	1 (4.2)		24 (100.0)		23	47
記載なし (%)							
総計 (%)	178,305 (96.6)	887 (0.5)	5,315 (2.9)	184,507 (100.0)	725	43,739	228,971
平均	6.87	8.04	10.49	6.98	8.34	6.92	6.98
標準偏差	6.99	7.13	7.56	7.04	8.19	7.01	7.04

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査