

表 1720 腹膜透析の経験 原疾患別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

原疾患	なし	あり(年末時点でカテーテルあり)	あり(年末時点でカテーテルなし)	合計	不明	記載なし	総計
慢性糸球体腎炎 (%)	52,344 (94.7)	361 (0.7)	2,563 (4.6)	55,268 (100.0)	216	13,093	68,577
慢性腎盂腎炎 (%)	1,619 (94.6)	8 (0.5)	84 (4.9)	1,711 (100.0)	15	439	2,165
急速進行性糸球体腎炎 (%)	1,450 (97.0)	10 (0.7)	35 (2.3)	1,495 (100.0)	8	331	1,834
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)	816 (95.6)	4 (0.5)	34 (4.0)	854 (100.0)	2	208	1,064
その他の分類不能の腎炎 (%)	716 (96.5)	2 (0.3)	24 (3.2)	742 (100.0)	3	204	949
多発性嚢胞腎 (%)	6,569 (98.0)	19 (0.3)	118 (1.8)	6,706 (100.0)	25	1,467	8,198
腎硬化症 (%)	17,137 (97.4)	76 (0.4)	382 (2.2)	17,595 (100.0)	60	3,805	21,460
悪性高血圧 (%)	1,445 (96.1)	9 (0.6)	49 (3.3)	1,503 (100.0)	3	375	1,881
糖尿病性腎症 (%)	71,165 (98.0)	241 (0.3)	1,241 (1.7)	72,647 (100.0)	278	17,582	90,507
SLE腎炎 (%)	1,241 (96.2)	9 (0.7)	40 (3.1)	1,290 (100.0)	7	253	1,550
アミロイド腎 (%)	254 (96.6)		9 (3.4)	263 (100.0)	1	61	325
痛風腎 (%)	653 (95.5)	5 (0.7)	26 (3.8)	684 (100.0)	1	143	828
先天性代謝異常による腎不全 (%)	142 (91.6)	2 (1.3)	11 (7.1)	155 (100.0)		22	177
腎・尿路結核 (%)	118 (95.9)		5 (4.1)	123 (100.0)	1	34	158
腎・尿路結石 (%)	345 (97.7)	1 (0.3)	7 (2.0)	353 (100.0)	2	75	430
腎・尿路腫瘍 (%)	546 (98.4)	1 (0.2)	8 (1.4)	555 (100.0)	2	129	686
閉塞性尿路障害 (%)	422 (96.6)	2 (0.5)	13 (3.0)	437 (100.0)	2	78	517
骨髄腫 (%)	167 (98.8)	1 (0.6)	1 (0.6)	169 (100.0)		21	190
腎形成不全 (%)	297 (84.1)	11 (3.1)	45 (12.7)	353 (100.0)		66	419
不明 (%)	15,541 (96.9)	78 (0.5)	418 (2.6)	16,037 (100.0)	90	3,998	20,125
再導入 (%)	1,131 (92.1)	16 (1.3)	81 (6.6)	1,228 (100.0)	3	186	1,417
その他 (%)	4,187 (96.5)	31 (0.7)	121 (2.8)	4,339 (100.0)	6	1,169	5,514
合計 (%)	178,305 (96.6)	887 (0.5)	5,315 (2.9)	184,507 (100.0)	725	43,739	228,971
記載なし (%)							
総計 (%)	178,305 (96.6)	887 (0.5)	5,315 (2.9)	184,507 (100.0)	725	43,739	228,971

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査