

表 1723 腹膜透析の経験 透析時間(時間/回)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回)

透析時間	なし	あり(年末時点でカテーテルあり)	あり(年末時点でカテーテルなし)	合計	不明	記載なし	総計
3.0未満 (%)	424 (98.8)	1 (0.2)	4 (0.9)	429 (100.0)	2	90	521
3.0～ (%)	19,563 (98.5)	78 (0.4)	219 (1.1)	19,860 (100.0)	133	4,827	24,820
3.5～ (%)	13,969 (98.1)	46 (0.3)	229 (1.6)	14,244 (100.0)	44	3,651	17,939
4.0～ (%)	120,024 (96.5)	633 (0.5)	3,693 (3.0)	124,350 (100.0)	420	30,228	154,998
4.5～ (%)	9,217 (95.3)	46 (0.5)	411 (4.2)	9,674 (100.0)	63	1,941	11,678
5.0～ (%)	12,465 (94.4)	76 (0.6)	660 (5.0)	13,201 (100.0)	50	2,336	15,587
5.5～ (%)	486 (94.7)	4 (0.8)	23 (4.5)	513 (100.0)	6	76	595
6.0～ (%)	824 (96.4)	3 (0.4)	28 (3.3)	855 (100.0)	3	136	994
6.5～ (%)	55 (100.0)			55 (100.0)		3	58
7.0～ (%)	424 (92.8)		33 (7.2)	457 (100.0)	3	51	511
合計 (%)	177,451 (96.6)	887 (0.5)	5,300 (2.9)	183,638 (100.0)	724	43,339	227,701
記載なし (%)	854 (98.3)		15 (1.7)	869 (100.0)	1	400	1,270
総計 (%)	178,305 (96.6)	887 (0.5)	5,315 (2.9)	184,507 (100.0)	725	43,739	228,971
平均	3.97	4.02	4.15	3.98	4.00	3.95	3.97
標準偏差	0.53	0.47	0.55	0.53	0.68	0.48	0.52

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査