

表 1724 腹膜透析の経験 血流量(ml/分)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

血流量	なし	あり(年末時点でカテ テルあり)	あり(年末時点でカテ テルなし)	合計	不明	記載なし	総計
100未満 (%)	40 (100.0)			40 (100.0)	1	3	44
100～ (%)	619 (97.9)	2 (0.3)	11 (1.7)	632 (100.0)	2	105	739
120～ (%)	1,765 (97.8)	14 (0.8)	26 (1.4)	1,805 (100.0)	6	337	2,148
140～ (%)	14,279 (97.8)	69 (0.5)	247 (1.7)	14,595 (100.0)	66	3,312	17,973
160～ (%)	4,832 (97.4)	22 (0.4)	106 (2.1)	4,960 (100.0)	10	931	5,901
180～ (%)	24,130 (97.5)	105 (0.4)	519 (2.1)	24,754 (100.0)	78	5,653	30,485
200～ (%)	78,836 (96.8)	385 (0.5)	2,260 (2.8)	81,481 (100.0)	429	18,580	100,490
220～ (%)	23,011 (96.0)	105 (0.4)	843 (3.5)	23,959 (100.0)	66	5,521	29,546
240～ (%)	20,889 (95.1)	134 (0.6)	931 (4.2)	21,954 (100.0)	47	5,059	27,060
260～ (%)	1,963 (95.8)	12 (0.6)	75 (3.7)	2,050 (100.0)	1	482	2,533
280～ (%)	1,804 (95.1)	8 (0.4)	84 (4.4)	1,896 (100.0)	9	432	2,337
300～ (%)	3,416 (95.1)	27 (0.8)	150 (4.2)	3,593 (100.0)	8	664	4,265
350～ (%)	354 (95.9)	2 (0.5)	13 (3.5)	369 (100.0)		60	429
400～ (%)	664 (98.1)		13 (1.9)	677 (100.0)		41	718
合計 (%)	176,602 (96.6)	885 (0.5)	5,278 (2.9)	182,765 (100.0)	723	41,180	224,668
記載なし (%)	1,703 (97.8)	2 (0.1)	37 (2.1)	1,742 (100.0)	2	2,559	4,303
総計 (%)	178,305 (96.6)	887 (0.5)	5,315 (2.9)	184,507 (100.0)	725	43,739	228,971
平均	204.84	206.62	212.97	205.08	199.43	204.38	204.94
標準偏差	37.25	35.44	35.85	37.23	28.21	32.72	36.42

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査