

表 1725 腹膜透析の経験 身長(cm)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

身長	なし	あり(年末時点でカテーテルあり)	あり(年末時点でカテーテルなし)	合計	不明	記載なし	総計
130未満 (%)	193 (96.0)	1 (0.5)	7 (3.5)	201 (100.0)	2	34	237
130～ (%)	476 (96.4)	1 (0.2)	17 (3.4)	494 (100.0)		74	568
135～ (%)	1,856 (97.4)	7 (0.4)	42 (2.2)	1,905 (100.0)	6	394	2,305
140～ (%)	6,688 (97.6)	24 (0.4)	142 (2.1)	6,854 (100.0)	33	1,396	8,283
145～ (%)	15,221 (97.1)	55 (0.4)	393 (2.5)	15,669 (100.0)	55	3,095	18,819
150～ (%)	23,935 (97.0)	125 (0.5)	613 (2.5)	24,673 (100.0)	100	5,241	30,014
155～ (%)	28,041 (96.8)	131 (0.5)	804 (2.8)	28,976 (100.0)	92	5,789	34,857
160～ (%)	33,722 (96.9)	157 (0.5)	938 (2.7)	34,817 (100.0)	115	7,326	42,258
165～ (%)	29,764 (96.1)	182 (0.6)	1,014 (3.3)	30,960 (100.0)	89	6,527	37,576
170～ (%)	18,759 (95.8)	97 (0.5)	723 (3.7)	19,579 (100.0)	64	4,184	23,827
175～ (%)	6,735 (95.6)	33 (0.5)	280 (4.0)	7,048 (100.0)	22	1,479	8,549
180～ (%)	1,775 (95.9)	7 (0.4)	69 (3.7)	1,851 (100.0)	4	399	2,254
185～ (%)	274 (96.1)	2 (0.7)	9 (3.2)	285 (100.0)	2	64	351
190～ (%)	46 (95.8)		2 (4.2)	48 (100.0)	1	8	57
合計 (%)	167,485 (96.6)	822 (0.5)	5,053 (2.9)	173,360 (100.0)	585	36,010	209,955
記載なし (%)	10,820 (97.1)	65 (0.6)	262 (2.4)	11,147 (100.0)	140	7,729	19,016
総計 (%)	178,305 (96.6)	887 (0.5)	5,315 (2.9)	184,507 (100.0)	725	43,739	228,971
平均	159.87	160.71	161.37	159.91	159.07	160.09	159.94
標準偏差	9.59	9.18	9.56	9.59	10.52	9.58	9.59

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査