

表 1726 腹膜透析の経験 透析後体重(kg)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

透析後体重	なし	あり(年末時点でカテーテルあり)	あり(年末時点でカテーテルなし)	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	61 (92.4)		5 (7.6)	66 (100.0)	3	15	84
20～ (%)	634 (96.1)	3 (0.5)	23 (3.5)	660 (100.0)	4	138	802
30～ (%)	15,103 (97.1)	71 (0.5)	387 (2.5)	15,561 (100.0)	94	3,462	19,117
40～ (%)	47,173 (96.8)	236 (0.5)	1,316 (2.7)	48,725 (100.0)	207	10,877	59,809
50～ (%)	56,504 (96.6)	259 (0.4)	1,743 (3.0)	58,506 (100.0)	233	13,370	72,109
60～ (%)	34,478 (96.3)	198 (0.6)	1,131 (3.2)	35,807 (100.0)	98	8,177	44,082
70～ (%)	13,476 (96.8)	65 (0.5)	383 (2.8)	13,924 (100.0)	36	3,224	17,184
80～ (%)	4,759 (96.3)	23 (0.5)	160 (3.2)	4,942 (100.0)	18	1,121	6,081
90～ (%)	1,705 (96.4)	4 (0.2)	60 (3.4)	1,769 (100.0)	6	420	2,195
100～ (%)	602 (98.9)	1 (0.2)	6 (1.0)	609 (100.0)	2	144	755
110～ (%)	225 (97.4)		6 (2.6)	231 (100.0)	1	67	299
120～ (%)	147 (98.0)		3 (2.0)	150 (100.0)		39	189
合計 (%)	174,867 (96.6)	860 (0.5)	5,223 (2.9)	180,950 (100.0)	702	41,054	222,706
記載なし (%)	3,438 (96.7)	27 (0.8)	92 (2.6)	3,557 (100.0)	23	2,685	6,265
総計 (%)	178,305 (96.6)	887 (0.5)	5,315 (2.9)	184,507 (100.0)	725	43,739	228,971
平均	55.40	55.17	55.92	55.42	52.83	55.62	55.45
標準偏差	12.90	11.97	12.58	12.89	12.70	12.94	12.90

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査