

表 1727 腹膜透析の経験 体重減少量(kg)別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

体重減少量	なし	あり(年末時点でカテーテルあり)	あり(年末時点でカテーテルなし)	合計	不明	記載なし	総計
0.0未満 (%)	579 (95.5)	3 (0.5)	24 (4.0)	606 (100.0)	1	148	755
0.0～ (%)	6,679 (96.9)	37 (0.5)	180 (2.6)	6,896 (100.0)	37	1,517	8,450
1.0～ (%)	32,198 (96.4)	169 (0.5)	1,018 (3.0)	33,385 (100.0)	152	7,488	41,025
2.0～ (%)	56,920 (95.9)	324 (0.5)	2,114 (3.6)	59,358 (100.0)	233	13,570	73,161
3.0～ (%)	29,561 (95.6)	148 (0.5)	1,223 (4.0)	30,932 (100.0)	102	7,076	38,110
4.0～ (%)	7,293 (95.7)	41 (0.5)	287 (3.8)	7,621 (100.0)	19	1,805	9,445
5.0～ (%)	1,492 (95.0)	11 (0.7)	67 (4.3)	1,570 (100.0)	2	386	1,958
6.0～ (%)	306 (96.2)	2 (0.6)	10 (3.1)	318 (100.0)	1	76	395
7.0～ (%)	64 (97.0)		2 (3.0)	66 (100.0)	2	27	95
8.0～ (%)	129 (98.5)		2 (1.5)	131 (100.0)	1	28	160
合計 (%)	135,221 (96.0)	735 (0.5)	4,927 (3.5)	140,883 (100.0)	550	32,121	173,554
記載なし (%)	2,513 (96.0)	20 (0.8)	86 (3.3)	2,619 (100.0)	19	2,017	4,655
総計 (%)	137,734 (96.0)	755 (0.5)	5,013 (3.5)	143,502 (100.0)	569	34,138	178,209
平均	2.48	2.48	2.58	2.48	2.35	2.50	2.49
標準偏差	1.05	1.00	0.99	1.05	1.47	1.05	1.05

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査