

表 1728 腹膜透析の経験 体重減少率(%)別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

体重減少率	なし	あり(年末時点でカテーテルあり)	あり(年末時点でカテーテルなし)	合計	不明	記載なし	総計
1.0未満 (%)	2,889 (96.5)	17 (0.6)	89 (3.0)	2,995 (100.0)	20	681	3,696
1.0～ (%)	5,202 (96.6)	29 (0.5)	153 (2.8)	5,384 (100.0)	16	1,209	6,609
2.0～ (%)	13,275 (96.8)	63 (0.5)	379 (2.8)	13,717 (100.0)	55	3,149	16,921
3.0～ (%)	27,054 (96.2)	153 (0.5)	912 (3.2)	28,119 (100.0)	125	6,340	34,584
4.0～ (%)	36,050 (95.8)	200 (0.5)	1,399 (3.7)	37,649 (100.0)	144	8,622	46,415
5.0～ (%)	28,211 (95.7)	147 (0.5)	1,126 (3.8)	29,484 (100.0)	110	6,695	36,289
6.0～ (%)	14,321 (95.7)	83 (0.6)	563 (3.8)	14,967 (100.0)	61	3,399	18,427
7.0～ (%)	5,519 (95.8)	32 (0.6)	211 (3.7)	5,762 (100.0)	8	1,338	7,108
8.0～ (%)	1,698 (96.0)	8 (0.5)	63 (3.6)	1,769 (100.0)	8	418	2,195
9.0～ (%)	919 (96.3)	3 (0.3)	32 (3.4)	954 (100.0)	1	250	1,205
合計 (%)	135,138 (96.0)	735 (0.5)	4,927 (3.5)	140,800 (100.0)	548	32,101	173,449
記載なし (%)	2,596 (96.1)	20 (0.7)	86 (3.2)	2,702 (100.0)	21	2,037	4,760
総計 (%)	137,734 (96.0)	755 (0.5)	5,013 (3.5)	143,502 (100.0)	569	34,138	178,209
平均	4.53	4.54	4.65	4.53	4.36	4.54	4.53
標準偏差	1.65	1.61	1.60	1.65	1.57	1.66	1.65

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査