

表 1729 腹膜透析の経験 Body Mass Index別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

Body Mass Index	なし	あり(年末時点でカテーテルあり)	あり(年末時点でカテーテルなし)	合計	不明	記載なし	総計
14未満 (%)	1,041 (96.4)	6 (0.6)	33 (3.1)	1,080 (100.0)	6	225	1,311
14～ (%)	6,134 (97.0)	30 (0.5)	162 (2.6)	6,326 (100.0)	29	1,251	7,606
16～ (%)	19,652 (96.4)	111 (0.5)	627 (3.1)	20,390 (100.0)	75	4,015	24,480
18～ (%)	34,445 (96.4)	172 (0.5)	1,110 (3.1)	35,727 (100.0)	122	7,307	43,156
20～ (%)	38,068 (96.5)	196 (0.5)	1,186 (3.0)	39,450 (100.0)	122	8,108	47,680
22～ (%)	29,423 (96.7)	130 (0.4)	859 (2.8)	30,412 (100.0)	98	6,300	36,810
24～ (%)	17,490 (96.7)	88 (0.5)	502 (2.8)	18,080 (100.0)	57	3,776	21,913
26～ (%)	9,294 (97.0)	36 (0.4)	252 (2.6)	9,582 (100.0)	22	2,084	11,688
28～ (%)	4,788 (96.7)	25 (0.5)	139 (2.8)	4,952 (100.0)	12	1,027	5,991
30～ (%)	4,174 (97.3)	12 (0.3)	106 (2.5)	4,292 (100.0)	13	859	5,164
合計 (%)	164,509 (96.6)	806 (0.5)	4,976 (2.9)	170,291 (100.0)	556	34,952	205,799
記載なし (%)	13,796 (97.0)	81 (0.6)	339 (2.4)	14,216 (100.0)	169	8,787	23,172
総計 (%)	178,305 (96.6)	887 (0.5)	5,315 (2.9)	184,507 (100.0)	725	43,739	228,971
平均	21.46	21.17	21.30	21.45	20.97	21.51	21.46
標準偏差	3.66	3.51	3.55	3.66	3.57	3.65	3.66

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査