

表 1730 腹膜透析の経験 透析前BUN(mg/dL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

透析前BUN	なし	あり(年末時点でカテーテルあり)	あり(年末時点でカテーテルなし)	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	383 (96.0)	6 (1.5)	10 (2.5)	399 (100.0)	3	77	479
20～ (%)	1,933 (96.4)	15 (0.7)	57 (2.8)	2,005 (100.0)	15	460	2,480
30～ (%)	8,112 (97.2)	44 (0.5)	189 (2.3)	8,345 (100.0)	43	1,970	10,358
40～ (%)	21,074 (96.8)	113 (0.5)	593 (2.7)	21,780 (100.0)	97	4,934	26,811
50～ (%)	33,288 (96.2)	158 (0.5)	1,154 (3.3)	34,600 (100.0)	130	7,929	42,659
60～ (%)	33,264 (95.9)	162 (0.5)	1,269 (3.7)	34,695 (100.0)	121	7,827	42,643
70～ (%)	22,038 (95.2)	135 (0.6)	980 (4.2)	23,153 (100.0)	71	5,098	28,322
80～ (%)	10,178 (95.2)	62 (0.6)	454 (4.2)	10,694 (100.0)	51	2,467	13,212
90～ (%)	3,731 (95.3)	28 (0.7)	156 (4.0)	3,915 (100.0)	12	876	4,803
100～ (%)	1,046 (94.4)	11 (1.0)	51 (4.6)	1,108 (100.0)	9	231	1,348
110～ (%)	306 (93.6)	4 (1.2)	17 (5.2)	327 (100.0)		67	394
120～ (%)	160 (94.7)	2 (1.2)	7 (4.1)	169 (100.0)		35	204
合計 (%)	135,513 (96.0)	740 (0.5)	4,937 (3.5)	141,190 (100.0)	552	31,971	173,713
記載なし (%)	2,221 (96.1)	15 (0.6)	76 (3.3)	2,312 (100.0)	17	2,167	4,496
総計 (%)	137,734 (96.0)	755 (0.5)	5,013 (3.5)	143,502 (100.0)	569	34,138	178,209
平均	60.88	61.91	63.40	60.97	59.49	60.83	60.94
標準偏差	15.64	17.36	15.45	15.65	16.75	15.56	15.64

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査