

表 1731 腹膜透析の経験 透析前クレアチニン濃度(mg/dL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

透析前クレアチニン濃度	なし	あり(年末時点でカテーテルあり)	あり(年末時点でカテーテルなし)	合計	不明	記載なし	総計
2未満 (%)	63 (100.0)			63 (100.0)	1	12	76
2～ (%)	1,303 (98.6)	3 (0.2)	16 (1.2)	1,322 (100.0)	19	315	1,656
4～ (%)	6,211 (97.9)	28 (0.4)	103 (1.6)	6,342 (100.0)	50	1,403	7,795
6～ (%)	19,006 (97.6)	75 (0.4)	393 (2.0)	19,474 (100.0)	105	4,427	24,006
8～ (%)	36,411 (96.9)	165 (0.4)	1,018 (2.7)	37,594 (100.0)	139	8,382	46,115
10～ (%)	37,394 (95.7)	216 (0.6)	1,461 (3.7)	39,071 (100.0)	127	8,836	48,034
12～ (%)	22,863 (94.4)	165 (0.7)	1,198 (4.9)	24,226 (100.0)	79	5,449	29,754
14～ (%)	9,133 (93.5)	63 (0.6)	567 (5.8)	9,763 (100.0)	25	2,248	12,036
16～ (%)	3,096 (93.8)	25 (0.8)	181 (5.5)	3,302 (100.0)	7	791	4,100
合計 (%)	135,480 (96.0)	740 (0.5)	4,937 (3.5)	141,157 (100.0)	552	31,863	173,572
記載なし (%)	2,254 (96.1)	15 (0.6)	76 (3.2)	2,345 (100.0)	17	2,275	4,637
総計 (%)	137,734 (96.0)	755 (0.5)	5,013 (3.5)	143,502 (100.0)	569	34,138	178,209
平均	10.25	10.86	11.26	10.29	9.39	10.31	10.29
標準偏差	2.78	2.72	2.67	2.78	2.96	2.81	2.79

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査