

表 1732 腹膜透析の経験 single pool Kt/V(Kt/Vsp)別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

single pool Kt/V (Kt/Vsp)	なし	あり(年末時点でカテー テルあり)	あり(年末時点でカテー テルなし)	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満 (%)	78 (98.7)		1 (1.3)	79 (100.0)		21	100
0.4～ (%)	133 (95.0)	1 (0.7)	6 (4.3)	140 (100.0)		27	167
0.6～ (%)	620 (97.5)	7 (1.1)	9 (1.4)	636 (100.0)	2	136	774
0.8～ (%)	3,548 (97.2)	23 (0.6)	78 (2.1)	3,649 (100.0)	14	841	4,504
1.0～ (%)	14,314 (96.6)	81 (0.5)	416 (2.8)	14,811 (100.0)	42	3,475	18,328
1.2～ (%)	32,397 (96.5)	167 (0.5)	1,024 (3.0)	33,588 (100.0)	114	7,949	41,651
1.4～ (%)	35,864 (95.9)	163 (0.4)	1,358 (3.6)	37,385 (100.0)	154	8,597	46,136
1.6～ (%)	23,154 (95.6)	134 (0.6)	935 (3.9)	24,223 (100.0)	123	5,289	29,635
1.8～ (%)	11,066 (94.9)	66 (0.6)	524 (4.5)	11,656 (100.0)	48	2,487	14,191
2.0～ (%)	6,441 (94.5)	38 (0.6)	336 (4.9)	6,815 (100.0)	37	1,514	8,366
合計 (%)	127,615 (96.0)	680 (0.5)	4,687 (3.5)	132,982 (100.0)	534	30,336	163,852
記載なし (%)	10,119 (96.2)	75 (0.7)	326 (3.1)	10,520 (100.0)	35	3,802	14,357
総計 (%)	137,734 (96.0)	755 (0.5)	5,013 (3.5)	143,502 (100.0)	569	34,138	178,209
平均	1.48	1.49	1.54	1.49	1.53	1.48	1.48
標準偏差	0.30	0.32	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査