

表 1733 腹膜透析の経験 equilibrated Kt/V (eKt/V) 別 (施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

equilibrated Kt/V (eKt/V)	なし	あり(年末時点でカテー テルあり)	あり(年末時点でカテー テルなし)	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満 (%)	106 (99.1)		1 (0.9)	107 (100.0)		27	134
0.4～ (%)	290 (95.4)	3 (1.0)	11 (3.6)	304 (100.0)	2	60	366
0.6～ (%)	2,229 (97.3)	19 (0.8)	44 (1.9)	2,292 (100.0)	10	536	2,838
0.8～ (%)	11,792 (97.0)	65 (0.5)	299 (2.5)	12,156 (100.0)	35	2,849	15,040
1.0～ (%)	32,934 (96.5)	176 (0.5)	1,014 (3.0)	34,124 (100.0)	110	8,161	42,395
1.2～ (%)	40,268 (96.0)	181 (0.4)	1,511 (3.6)	41,960 (100.0)	177	9,631	51,768
1.4～ (%)	24,451 (95.4)	140 (0.5)	1,028 (4.0)	25,619 (100.0)	129	5,575	31,323
1.6～ (%)	10,305 (94.9)	68 (0.6)	484 (4.5)	10,857 (100.0)	42	2,298	13,197
1.8～ (%)	3,406 (94.6)	12 (0.3)	182 (5.1)	3,600 (100.0)	16	761	4,377
2.0～ (%)	1,894 (93.3)	17 (0.8)	118 (5.8)	2,029 (100.0)	13	446	2,488
合計 (%)	127,675 (96.0)	681 (0.5)	4,692 (3.5)	133,048 (100.0)	534	30,344	163,926
記載なし (%)	10,059 (96.2)	74 (0.7)	321 (3.1)	10,454 (100.0)	35	3,794	14,283
総計 (%)	137,734 (96.0)	755 (0.5)	5,013 (3.5)	143,502 (100.0)	569	34,138	178,209
平均	1.29	1.30	1.35	1.30	1.33	1.29	1.29
標準偏差	0.27	0.30	0.29	0.27	0.28	0.27	0.27

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査