

表 1734 腹膜透析の経験 nPCR(g/kg/day)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

nPCR	なし	あり(年末時点でカテーテルあり)	あり(年末時点でカテーテルなし)	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満 (%)	304 (96.2)	6 (1.9)	6 (1.9)	316 (100.0)		53	369
0.4～ (%)	6,547 (97.1)	41 (0.6)	156 (2.3)	6,744 (100.0)	35	1,639	8,418
0.6～ (%)	39,861 (96.7)	198 (0.5)	1,165 (2.8)	41,224 (100.0)	169	9,563	50,956
0.8～ (%)	54,933 (95.9)	256 (0.4)	2,089 (3.6)	57,278 (100.0)	206	13,027	70,511
1.0～ (%)	21,856 (94.7)	144 (0.6)	1,069 (4.6)	23,069 (100.0)	99	5,080	28,248
1.2～ (%)	3,795 (94.9)	30 (0.7)	176 (4.4)	4,001 (100.0)	23	892	4,916
1.4～ (%)	407 (92.1)	5 (1.1)	30 (6.8)	442 (100.0)	3	110	555
1.6～ (%)	64 (94.1)	1 (1.5)	3 (4.4)	68 (100.0)		11	79
1.8～ (%)	18 (94.7)		1 (5.3)	19 (100.0)		6	25
2.0～ (%)	34 (94.4)		2 (5.6)	36 (100.0)		2	38
合計 (%)	127,819 (96.0)	681 (0.5)	4,697 (3.5)	133,197 (100.0)	535	30,383	164,115
記載なし (%)	9,915 (96.2)	74 (0.7)	316 (3.1)	10,305 (100.0)	34	3,755	14,094
総計 (%)	137,734 (96.0)	755 (0.5)	5,013 (3.5)	143,502 (100.0)	569	34,138	178,209
平均	0.86	0.87	0.90	0.86	0.86	0.86	0.86
標準偏差	0.18	0.20	0.18	0.18	0.19	0.17	0.18

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査